

Los 5 trucos para entrar conejas c


Introducción de animales

El procedimiento más rápido y rentable para incrementar el beneficio de una explotación es la introducción de reproductoras F1 -ya sea directamente o a través de abuelas-mejoradas genéticamente y con alto estado sanitario. En la actualidad, las explotaciones modernas están trabajando con reposiciones anuales que oscilan entre el 8 y 12% mensuales, lo que quiere decir que cualquier decisión que tomemos a nivel de este colectivo repercutirá directamente sobre el 10% mensual de la producción total de la explotación.

1

MINIMIZAR

- Todos sabemos que cualquier introducción de animales conlleva un riesgo sanitario.
- La introducción de reproductoras —o reproductores— de diversos orígenes supone un riesgo mayor ya que el peligro de contagio de enfermedades se multiplica.



2

REDUCIR

Cómo reducir el riesgo:

- **Selección de la fuente de animales.** La sanidad de las explotaciones de las empresas de genética y el transporte de sus animales son vitales para evitar el contagio de enfermedades.
- **Cuarentena.** El riesgo de enfermedad puede reducirse alojando a los nuevos animales en locales aislados.

3

AISLAR


El estricto aislamiento de los nuevos animales respecto a los ya existentes nos permitirá evaluar cual es el estado sanitario real.

Puntos a cumplir para que la cuarentena sea realmente efectiva:

- La cuarentena debe localizarse fuera de la nave, y lo más conveniente que hubiera entre 50 y 100 metros de la explotación.
- Funcionar independientemente de la explotación: pienso, materiales de trabajo, etc.
- Seguir un manejo todo dentro-todo fuera.
- Permitir el alojamiento de cómo mínimo 40 días en los que poder inspeccionar de forma minuciosa y diariamente a los animales.
- Avisar a los servicios veterinarios ante la menor sospecha de cualquier enfermedad, y siempre antes de efectuar un tratamiento veterinario, para poder detectar con facilidad si la enfermedad es perjudicial o no.

on éxito

F. X. Mora, J. Gifra
ASVET Veterinaria s.l.



4

ADAPTAR

Maximizar la expresión del potencial genético de las primerizas.

Las reproductoras de origen externo que se incorporan a nuestra explotación lo hacen con su propia microflora bacteriana y con unas defensas más o menos fuertes frente a los gérmenes de la explotación origen.

Estas defensas pueden no protegerlas frente a los gérmenes que tenemos en nuestra explotación.


El contacto con la microflora de nuestra explotación debe ser gradual para evitar que enfermen. Este proceso se llama **ADAPTACIÓN**. Si se realiza adecuadamente conseguiremos que el potencial de los animales se exprese al máximo.

Para conseguir que esta adaptación sea correcta, sería conveniente que en la fase final del periodo de reposición estuvieran en contacto con animales provenientes de la explotación y que en el momento del parto se las agrupara en uno o varios departamentos de jaulas en un extremo de la nave.

ecto a los ya existentes en la explotación
l de estos.

nte efectiva:

r sería
de distancia.
en cuanto



5

TRATAR

En el periodo de cuarentena sería conveniente:

- Aplicar las vacunas según el protocolo de la explotación.
- Realizar tratamiento antiparasitario

